



DLP 16-6-60 058066

# BULLETIN TECHNIQUE

## de la Station d'Avertissements Agricoles

### RHÔNE-ALPES

4, Place Gensoul — LYON Téléphone : 37-20-56  
C. C. P. LYON 9430-12 Régisseur Recettes Protection végétaux

Lisez sur l'enveloppe de votre bulletin  
le numéro de votre région

N° 277

15 Juin 1960

#### PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CHUTE DE GRÊLE

Il est rappelé aux viticulteurs et aux arboriculteurs qu'il est toujours indispensable d'effectuer un traitement anticryptogamique aussitôt que possible après une chute de grêle afin de favoriser la cicatrisation des plaies.

#### VIGNE

#### AVERTISSEMENTS

MILDIOU (& BLACK-ROT pour la Savoie et le Bugey): Des foyers primaires de Mildiou ont été repérés autour du 30 mai et du 9 juin dans diverses localités, notamment vallée de la Saône et région Drôme-Ardèche. Quant au black-rot, il reste très dangereux actuellement.

En raison de la croissance actuelle de la vigne et des nombreuses pluies locales qui se sont produites depuis le 31 mai, les traitements précédents devront être renouvelés au bout de 10 à 12 jours, ou, à défaut, dès réception de ce bulletin, en toutes régions.

VERS DE LA GRAPPE: les attaques de 1ère génération étant terminées, il n'y a pas lieu pour l'instant de prévoir de nouveau traitement jusqu'au prochain avis.

#### INFORMATIONS

OIDIUM: on doit continuer à surveiller et à traiter régulièrement cette maladie sur cépages sensibles.

#### ARBRES FRUITIERS

#### AVERTISSEMENTS

TAVELURES: le traitement précédent devra être renouvelé au bout de 12 jours ou même plus tôt en cas de forte pluie.

CARPOCAPSE: 1°- Continuer les traitements aux cadences indiquées dans les bulletins précédents.

2°- Étendre le premier traitement dès réception aux régions non encore citées dans les bulletins précédents.

Toutefois sur les quelques plantations situées au-dessus des altitudes suivantes (exposition sud): Drôme, Ardèche: 1000m - Isère, Rhône, Savoie, Ain: 900m - Loire, Hte Savoie: 800m (100m plus bas en exposition nord), le 1er traitement pourra être encore retardé.

P.1279

## PETITS FRUITS

### INFORMATIONS

Les traitements contre la Sésie du groseillier ( sur groseillier et cassissier ), contre didymella et anthracnose sur framboisier, devront être renouvelés au terme de 15 à 18 jours ou, à défaut, dès réception.

## GRANDES CULTURES

### AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POINTE DE TERRE: Le traitement précédent devra être renouvelé au bout de 8 à 10 jours ou, à défaut, dès réception. De plus, les traitements seront étendus jusqu'aux altitudes suivantes:

Drôme et Ardèche: 900m  
Ain, Isère, Rhône, Savoie 800m  
Loire, Hte-Savoie: 700m

A cette occasion on surveillera l'apparition de nouvelles larves du doryphore et on adjoindra le cas échéant un insecticide approprié à la bouillie fongicide.

TEIGNE & CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE: Un premier traitement combiné devra être appliqué dès réception, par adjonction à un des insecticides précédemment cités (voir bulletin N° 275 du 21 mai 1960) un des fongicides suivants:

- bouillie bordelaise ou bourguignonne à 2kg/hl de sulfate
- sulfate basique, oxychlorure ou oxyde cuivreux à raison de 500gr/hl de cuivre  
métal
- association zinèbe-cuivre à raison d'au moins 60gr/hl de zinèbe et 150gr/hl  
de cuivre
- dimethyl dithio carbamate de cuivre à raison de 250gr/hl de matière active

PYRALE DU MAÏS (Drôme, Isère, Ain)

Le premier traitement devra être appliqué entre le 20 et le 25 juin à l'aide d'un produit à base de D.D.T. ou de toxaphène.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles  
P. LATARD

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux  
A. PITHIoud